



## QUI PEUT VENIR

Les adhérents à la multi-activités du CSMF à jour de leurs cotisations.

Comme chaque année pendant l'été, les adhérents de Dunois, Bellan Ivry et Paganini sont les bienvenus pendant la fermeture de leur salle.

### Prévention des risques pour les personnes vulnérables

Certaines personnes présentent plus de risques de contamination et sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour se protéger au maximum. Si vous estimez en faire partie au vu de la liste ci-dessous **vous ne devez pas pour le moment participer à nos activités.**

En application de cette mesure les activités de la **section séniors du CSMF** restent suspendues pour le moment.

### Personnes concernées :

les critères permettant d'identifier les personnes vulnérables, définis par le décret N° 2020-521 du 05/05/2020, sont les suivants :

- Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
- Les femmes enceintes dans leur troisième trimestre ;
- Les personnes ayant des antécédents (ATCD) cardiovasculaires :
  - + Hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales),
  - + ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie,
  - + De chirurgie cardiaque,
  - + Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
- Les personnes atteintes de diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- Les personnes présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- Les personnes atteintes d'un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Les personnes présentant un IMC supérieur à 30 kgm<sup>2</sup> ;
- Les personnes atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :

+ médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

+ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm<sup>3</sup>;

+ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

+ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

- Les personnes atteintes de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

- Les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie